

**Papp V.: Bükkösök természetközeli állapotát
indikáló lignikol nagygombák a Juhdölgő-völgy
Erdőrezervátumból. Mikol. Közlem., Clusiana
51(1):75-76. 2012**

Reference

Papp Viktor: Bükkösök természetközeli állapotát indikáló lignikol nagygombák a Juhdölgő-völgy Erdőrezervátumból - Lignicolous macrofungi as indicators of nature value of beech forest from the Juhdöglő-völgy Forest Reserve.

Poszterszekció 1. Gombarendszertan és ökológia - Poster Session 1, Fungal systematics and ecology, Mikológiai Közlemények - CLUSIANA 51(1):75-76. 2012

Short reference

Papp (2012)

First author

Papp Viktor

Year

2012

Abstract

A Juhdölgő-völgy Erdőrezervátum a Vértes-hegységben, mintegy 80,8 ha-os (magterület 25,7 ha) területen található. Az élőhely meghatározó fái a bükk (*Fagus sylvatica*) és a tölgyek (*Quercus cerris*, *Q. petraea*, *Q. pubescens*). A bükkös állomány relatíve kis kiterjedésű, de jelentős mennyiségű holt faanyagot tartalmaz. Ennek köszönhetően a rezervátum számos, ritka, veszélyeztetett lignikol nagygombának szolgál életteréül. A bükkös élőhelyek természetközeli állapotának és természetvédelmi értékének meghatározására Christensen és mtsai (2004) 106 európai erdőrezervátum adatai alapján 21 lignikol indikátorfajt jelöltek ki. Az általuk összeállított listát több európai ország mikológusai is használják, ezáltal lehetőséget adva az élőhelyek összehasonlítására.

A Juhdöglő-völgy Erdőrezervátumban élő lignikol nagygombák felvételezését 2010 őszén kezdtem, és a vizsgálatok még jelenleg is folynak. A területről ez idáig a 21 indikátorfajból 14 jelenlétét dokumentáltam. A pilotéciumos termőtestet képző fajok közül a *Flammulaster limulatus*, a *F. muricatus*, az *Ossicaulis lignatilis* és a *Pluteus umbrosus* fajokat sikerült kimutatni, valamint a *Pholiota squarrosoides*-t, illetve a *Hohenbuehelia auriscalpium*-ot, melyek Magyarországra újak bizonyultak. A taplófajok közül a területen gyakori volt az *Ischnoderma resinosum*, valamint a *Ceriporiopsis gilvescens*, a *C. pannocincta*, a *Ganoderma*

cupreolaccatum (syn. G. pfeifferi), az Inonotus cuticularis és a Spongipellis delectans termőtesteit is sikerült megtalálni. A Hericium coralloides előfordulását több alkalommal is dokumentáltam. A reszupinátus termőtestet képző Mycoacia nothofagi-t pedig első alkalommal sikerült Magyarországról kimutatni. Az eddigi adatok alapján megállapítható, hogy a Juhdöglő-völgy Erdőrezervátum lignikol nagygombák szempontjából az ország egyik kiemelkedő természetvédelmi jelentőségű élőhelye.

[biodiversity: fungus, lichen](#)

[deadwood](#)

[nature conservation](#)

Notes

A poszter a kéziratok között, külön tételként található.

Címszavazva - VA

Journal

Mikológiai Közlemények - CLUSIANA

Location

ER Archívum (2012/P-001/1, 2012/P-001/2)

Type

conference paper, abstract

Strict forest reserves

[Juhdöglő-völgy Forest Reserve](#)

Attached document

[Papp Viktor \(2012\) Juhdöglő, bükkös, taplógombák, absztrakt](#) 824.05 KB

Katalógusba vette

Horváth Ferenc és Gulyás Györgyi

Katalógusbavétel időpontja

Wed, 08/15/2012 - 12:00