

Kovács J. A. (1997): A Csödei erdő és környékének florisztikai, cönológiai és természetvédelmi adottságai. Kanitzia 5: 19-68.

Reference: Kovács J. A. (1997): A Csödei erdő és környékének florisztikai, cönológiai és természetvédelmi adottságai. Kanitzia 5: 19-68.

Short reference: Kovács (1997)

First author: Kovács J. A.

Year: 1997

Abstract

A Csödei erdő és környékének florisztikai, cönológiai és természetvédelmi adottságai

Floristical, coenological and conservational fundamentals of the forest Csöde and its neighbouring

Kovács J. A.

The work is dealing with the botanical and nature conservational investigations on vascular flora and vegetation of the forest Csöde and its neighbouring. The territory is situated in the North-Western part of Göcsej, at the border of Vas and Zala county its, including 200 hectares.

It is emphasized the existency of more than 300 vascular taxa. It is describe and presents the chorology the following protected and valuable species: *Aconitum vulparia*, *Aruncus sylvestris*, *Carlina acaulis*, *Cyclamen purpurascens*, *Dactylorhiza majalis*, *Daphne mezereum*, *Dryopteris carthusiana*, *Epipactis helleborine*, *Erythronium dens-canis*, *Galanthus nivalis*, *Helleborus dumetorum*, *Hemerocallis lilio-asphodelus*, *Hepatica nobilis*, *Lilium martagon*, *Neottia nidus-avis*, *Peucedanum carvifolia*, *Platanthera bifolia*, *Polygonum bistorta*, *Polystichum aculeatum*, *Primula vulgaris*, *Scilla drunensis*, *Vicia oroboides*. The big and vigorous populations of *Cyclamen purpurascens*, *Erythronium dens-canis*, *Helleborus purpurascens* and *Vicia oroboides* have a phytogeographical importance.

The forest and the herbaceous vegetation is characterized by the following plant communities: *Lemnetum minoris*, *Callitrichetum cophocarpae*, *Phragmitetum communis*, *Typhetum latifoliae*, *Glycerietum maximae*, *Caricetum elatae*, *Caricetum acutiformis*, *Carici-Phalaridetum*, *Succiso-Molinietum*, *Agrostio-Deschampsietum*, *Carici-Alopecuretum*, *Festucetum pratensis*, *Aegopodio-Petasitetum*, *Filipendulo-Geranietum palustris*, *Angelico-Cirsietum oleracei*,

Pastinaco-Arrhenatheretum, Alopecuro-Arrhenatheretum, Sambucetum ebuli, Eupatorio-Solidaginetum, Calamagrostietum epigeii, Fragario-Rubetum, Salicetum albae-fragilis, Calamagrosti-Salicetum cinareae, Aegopodio-Alnetum, Carici brizoidis-Alnetum, Cyclamini-Fagetum, Cyclamini-Carpinetum, Pruno spinosae-Crataegetum and cultivated types like Piceetum excelsae, Pinetum sylvestris, and Bromo sterili-Robinetum.

The most important vegetation units have been mapped on the detailed scale (1:5000). As an important natural landscape, representative for West-Transdanubia, with a special floral and coenological diversity and genesources, this small territory have been proposed to be protected area, used for educational aims and eco-tourism.

[phytosociology](#)

[nature conservation](#)

Notes

A Csödei erdő és környékének florisztikai, cönológiai és természetvédelmi adottságai

Floristical, coenological and conservational fundamentals of the forest Csöde and its neighbouring

Kovács J. A.

Tartalom:

Természeti viszonyok

A Csödei-erdő és környékének edényes flóralistája

Az edényes flóra értékelése

Védett és értékes növényfajok elterjedése

A Csödei-erdő és környékének növényzete

A növénytársulások rendszertani besorolása

Összegzés. A védetté nyilvánítás indoklása

Természetvédelmi javaslatok

Irodalom

vascular flora, plant chorology, plants communities, nature conservation, rare and protected species, vegetation map (UTM: XM-18, XM-28, CEC: 9165)

Címszavazva -GE

Publisher: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Növényteni Tanszék,
Szombathely

Journal: Kanitzia

Location: ER Archívum (1997/P-002)

Type: scientific paper

Katalógusba vette: Gulyás Györgyi

Katalógusbavétel időpontja: Wed, 05/06/2009 - 12:00