

Bidló András, Kovács Gábor (1998): A Nagybugaci Ősborókás Erdőrezervátum (11) termőhelyi vizsgálata, Kutatási jelentés, Sopron, 1997-1998. 32 old. + térképmelléletek

Reference: Bidló András, Kovács Gábor (1998): A Nagybugaci Ősborókás Erdőrezervátum (11) termőhelyi vizsgálata, Kutatási jelentés, Sopron, 1997-1998. 32 old. + térképmelléletek

Short reference: Bidló és Kovács (1998)

First author: Bidló András

Year: 1998

Abstract:

A vizsgált terület termőhelyét alapvetően a homok alapkőzet és ennek mozgása határozza meg. Azokon a részeken, ahol a homok még ma is mozgásban van, illetve csak az utóbbi évtizedekben állt meg a mozgása, futóhomok talajokat találunk. Ennél kissé kedvezőbbek a humuszos homok talajok, ahol már 10-20 cm vastag humuszos réteg is kialakult. Ez a két talajtípus előfordulásában élesen elkülönül a terület északkeleti részén található csernozjom jellegű homoktalajoktól. A két területet, egy valamikori vízállás (véltetőn csatorna) választja el, amely mentén réti talajokat találunk. A területen igen nagy jelentősége van a mikrodomborzatnak. Főleg a futóhomok és a humuszos homok talajtípussal jellemezhető részen fordul elő, hogy a buckatetőkön, illetve a buckák szélnek kitett oldalán a talajfejlődés még nem indult meg, addig a buckák között és különösen a kisebb mélyedésekben már vastag humuszos réteget találunk.

[élőhely: erdőssztyepppek](#)

[talaj - termőhely](#)

[térkép: talaj-, termőhelytérkép](#)

Notes:

Térképmelléletek:

- talajszelvények és talajfúrások helye és sorszáma
- genetikai talajtípus térkép
- humusz mennyisége térkép
- humuszos szint vastagsága térkép
- termőréteg vastagsága térkép
- fizikai féleség térkép
- talajvíz mélység térkép

Location: ER Archívum - digitális

Típus: kutatási jelentés, jegyzőkönyv, digitális adat

Strict forest reserves: [Nagybugaci Ősborókás Erdőrezervátum](#) Katalógusba vette:

Horváth Ferenc

Katalógusbavétel időpontja: 2022-08-19