

Kovács Gábor, Bidló András, Heil Bálint, Varga Bernadett (2008): A Bockerek-erdő termőhelyének és erdőállományának változása. In: Simon László (szerk.) Talajvédelem különszám, Nyíregyházi Főiskola, 121-130.

Reference: Kovács Gábor, Bidló András, Heil Bálint, Varga Bernadett (2008): A Bockerek-erdő termőhelyének és erdőállományának változása. In: Simon László (szerk.) Talajtani vándorgyűlés, Nyíregyháza, Talajvédelem különszám, Nyíregyházi Főiskola, 121-130.

Short reference: Kovács és mtsai (2008)

First author: Kovács Gábor

Year: 2008

Abstract

Gelénes, Tákos és Vámosatya községek határában helyezkedik el Bereg egyik erdészetileg is jelentős természeti értéke a Bockerek erdő. A mintegy 700 ha-os erdőtömbben a termőhelyi tényezők alakulását vizsgáltuk. Célunk volt az erdők egészségi állapotának vizsgálata a termőhelyi tényezők függvényében, magyarázatot kerestünk a kocsányos tölgy egészségi állapotának kedvezőtlen alakulására, a potenciális vegetáció típusok folyamatos átalakulására, illetve alapadatokat kívántunk szolgáltatni a Pro Silva alapú (természetközeli) erdőgazdálkodás bevezetéséhez. Meghatároztuk a jelenleg is ható, aktív termőhelyi tényezőket, és következtettünk a változás irányára. A Bockerek erdőben történő kocsányos tölgy száradás valamint a vegetációk folyamatos átalakulása elsősorban a csapadék- ill. a (talaj)vízhiányra vezethetők vissza. A vízhiány következtében csökken az állományok vitalitása, fogékonyabbá válnak más károsítókra. Az ismert folyamatok függvényében hosszú távon tervezhetők az erdészeti beavatkozások, kezelések.

élőhely: láp- és ligeterdők

talaj - termőhely

térkép: talaj-, termőhelytérkép

Publisher: Talajvédelmi Alapítvány, Budapest

Location: ER Archívum - digitális

Type: tudományos könyvrészlet, fejezet

Strict forest reserves: [Bockerek-erdő Erdőrezervátum](#) Katalógusba vette:

Horváth Ferenc

Katalógusbavétel időpontja: Tue, 09/06/2022 - 12:00