

Papp V. és Siller I. (2012): A *Ganoderma cupreolaccatum* (syn. *G. pfeifferi*) taxonómiai helyzete és magyarországi elterjedése. Mikol. Közlem., Clusiana 51(1): 76-78.

Reference: Papp Viktor és Siller Irén (2012): A *Ganoderma cupreolaccatum* (syn. *G. pfeifferi*) taxonómiai helyzete és magyarországi elterjedése - The Hungarian distribution and taxonomic status of *Ganoderma cupreolaccatum* (syn. *G. pfeifferi*). Poszterszekció 1. Gombarendszertan és ökológia - Poster session 1, Fungal systematics and ecology. Mikológiai Közlemények - Clusiana 51(1): 76-78.

Short reference: Papp és Siller (2012)

First author: Papp Viktor

Year: 2012

Abstract

Magyarország területén öt *Ganoderma* faj (*G. adspersum*, *G. applanatum*, *G. cupreolaccatum*, *G. lucidum*, *G. resinaceum*) található, melyek közül a *G. cupreolaccatum*-ról (syn. *G. pfeifferi*) rendelkezünk a legkevesebb információval. Ennek a főként élő, idős bükkfák tövében termőtestet képző fajnak mindösszesen hat hazai előfordulási adatát ismerjük (Börzsöny: Nagy-Hideg-hegy; Bükk: Óserdő Erdőrezervátum; Mecsek: Erdősmecske, Kőszegi-forrás Erdőrezervátum; Vértes: Pusztavám; Zalai-dombság: Vétyem Erdőrezervátum). Jelen munkában négy újabb adatát közöljük a Malomvölgyi-árokból és Dobogókőről (Visegrádi-hegység), a Tátika Erdőrezervátumból (Bakony), valamint a Juhdöglő-völgy Erdőrezervátumból (Vértes). Ez az Európában és hazánkban is igen ritka *Ganoderma* faj nem szerepel a magyarországi vörös listán és a védett fajok között sem. Ökológiai igényeinek és hazai elterjedésének ismeretében azonban természetvédelmi szempontból nagyobb figyelmet érdemelne. Névhasználatával kapcsolatban ellentmondásos információkat találtunk, ezért fontosnak tartottuk, hogy a nómenklaturai szabályoknak megfelelően tisztázzuk a faj taxonómiai helyzetét. Az első Kernertől kapott termőtestet Kalchbrenner határozta meg 1882-ben, és azt, mint új fajt *Polyporus cupreolaccatus* névvel jelölte. Ezt a nevet Wettstein *Polyporus laccatus*-ra egyszerűsítette. A későbbi mikológiai munkákban és a jelenlegi európai szakirodalomban viszont *Ganoderme pfeifferi* Bres. néven említik, melyet Patouillard közölt 1889-ben. Igmándy szerint a tévesen használt *pfeifferi* faji jelzőt azért részesítik előnyben, mert a *laccatus* nevet korábban már

a *G. lucidum*-ra is alkalmazták. Igmándy álláspontjával egyetértve, véleményünk szerint a prioritás elvének szem előtt tartásával a *Ganoderma cupreolaccatum* (Kalchbr.) Z. Igmándy 1968 név használata a helyes.

[biodiversity: fungus, lichen](#)

[taxonomy](#)

Notes

Címszavazva - VA

Journal: Mikológiai Közlemények, Clusiana

Location: ER Archívum (2012/P-002/1, 2012/P-002/2)

Type: conference paper, abstract

Strict forest reserves: [Juhdöglő-völgy Forest Reserve](#) Attached document: [Ganoder](#)

[Kőszegi-forrás Erdőrezervátum](#)

MB

[Óserdő Forest Reserve](#)

[Táti-És Gyöngyi](#)

[Vétek Forest Reserve](#) pontja: Wed, 08/15/2012 - 12:00