

Maros-hullámtér Erdőrezervátum

ER-14 (HU)

Maros-hullámtér Erdőrezervátum (Maros hullámtér)

core area: 21.3 ha; buffer zone: 39.7 ha; total area: 61 ha

Nagyalföld (ártér- és lápterület)

Délalföldi Erdészeti Zrt.

Körös-Maros National Park Directorate

Event history (EK)

Storyline

Hullámtéri szántóra (vagy gyepre) telepített, gyenge természeti értékű (fajszegény és jellegtelen), gyakran elegyes (de egykorú), puhafás-keményfás jellegű, dús cserjeszintű és idegenhonos fajokkal fertőzött erdő. A Maros vidékre tipikus; egyenlőre különösebb erdődinamikai kérdéseket nem vet fel.

1999

"It is a forest planted on floodplain arable land (or grassland) of weak nature value (species poor and uncharacteristic), often mixed (but even-aged), softwood and hardwood stands with dense shrub layer and infected with alien species. It is typical of the Maros region; it does not yet raise special questions of forest dynamics."

Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontrú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben [Classification and brief description of the forest reserves in 1999 from the viewpoint of research]

Classification 1999: Event history (EK)

Fő eredmények

Cseh, Viktória, Márton Kiss, Eszter Tanács (2014): Carbon sequestration of floodplain forests: A case study from Hungary, Maros river valley. TISCIA 40:3-10.

Selected publications

Összes publikáció

Cseh, Viktória, Márton Kiss, Eszter Tanács (2014): Carbon sequestration of floodplain forests: A case study from Hungary, Maros river valley. TISCIA 40:3-10.

2002

Horváth F. és Bölöni J. [összeállította] (2002): Az erdőrezervátumok kutatásszemponútú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben. In: Horváth és Borhidi [szerk.]: A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei, TermészetBÚVÁR Kiadó, Bp, 276-287.