

Zoltán László (2018): A 2014-es jégtörés és az azt követő kitermelés hatásai a Börzsöny erdeiben. Diplomamunka, ELTE TTK, Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék, 94 old.

Teljes hivatkozás: Zoltán László (2018): A 2014-es jégtörés és az azt követő kitermelés hatásai a Börzsöny erdeiben. Diplomamunka, ELTE TTK, Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék, 94 old.

Rövid hivatkozás: Zoltán (2018)

Első szerző: Zoltán László

Év: 2018

Összefoglalás:

Az elmúlt 40-50 év során Európa erdeit egyre nagyobb intenzitású természetes bolygatások érték, sokszor jelentős gazdasági károkat okozva. 2014. december első napjaiban az elmúlt 50 év legnagyobb intenzitású és kiterjedésű jégtörése történt a Börzsönyben. Korábbi börzsönyi vizsgálatok tapasztalataira építve MSc diplomamunkám keretében terepi felméréseket végeztem (összesen majdnem 1000 db, egyenként 500 m²-es mintavételi ponton). A vizsgált területek egy részén a jégtörés előtt is történt adatgyűjtés (azonos módszertan alapján, mint amit én használtam), így ezek újra felvételezése lehetővé tette a jégtörés és az egészségügyi termelés erdőre gyakorolt hatásainak felmérését. A jégtörés közvetlen hatásainak elemzése alapján megállapítható, hogy az első két vegetációperiódusban a jégkár okozta lombkoronavesztés legmarkánsabban a nitrofil lágyszárúak tömeges felszaporodását, illetve az alacsony (<50 cm) újulat borításának növekedését váltotta ki. Eredményeim alapján összetételben és korban homogén, magas bükk elegyarányú, kedvezőtlen állékonysági mutatókkal rendelkező gazdasági művelés alatt álló állományok a legérzékenyebbek a jégtörésekre. A jégtörés utáni kitermelés ismételt, antropogén bolygatást jelent és további módosító hatásai vannak. E változások mértékét befolyásolhatja, hogy milyen technikával végezték a kitermelést. Az erdészeti gépek által okozott talajbolygatás jobban károsítja az újulatot és nagyobb nitrofil lágyszárú borítást eredményez, mint a tradicionális közelítési technikák (lovas, kézi). A nitrofil lágyszárúak vizsgálata során megállapítható, hogy a talajbolygatás és a lombkoronavesztés mértékétől függ a fajszámuk is. Az erdőgazdálkodásból több évtizede kivont

Pogány-Rózsás Erdőrezervátum területén az erdők a gazdaságiakhoz képest valamivel kevésbé károsodtak: mind a dőlés/koronatörés arányban, mind a nitrofil lágyszárúak borításának és az újulat mennyiségének növekedésében. A dolgozat eredményei egy, a természeteshez közelebbi gazdálkodási módszer kialakításának szükségességét támasztják alá, de legalábbis a szálaló üzem mód nagyobb területű alkalmazását szorgalmazza, kíméletes, talajbolygatást minimalizáló közelítési technikák használata mellett.

élőhely: gyertyános-tölgyesek, bükkösök

erdőkár, kártevők, betegségek

erdőszerkezet: faállomány

erdőszerkezet: gyepszint

erdőszerkezet: újulat

meteorológia, időjárás, éghajlat, hidrológia

módszertan: felmérés, monitorozás

térkép: erdőtérkép, üzemtervi térkép

Megjegyzések:

Forrás: Greenfo SZAKDOLGOZATOK

<https://greenfo.hu/szakedolgozatok/a-2014-es-jegtores-es-az-azt-koveto-kitermeles-hatasai-a-borzsony-erdeiben/>

letöltés: 2024.01.01

Lelőhely: ER Archívum - digitális

Típus: BSc, MSc, Dipl. Ing dolgozat, tézisfüzet

Erdőrezervátumok: [Pogány - Rózsás Erdőrezervátum](#) Katalógusba vette:

Horváth Ferenc

Katalógusbavétel időpontja: 2024-01-01