

Merkl Ottó (2016): A szaproxilofág bogarak (Coleoptera) szerepe a holtfa lebontásában. In: Korda Márton (szerk.) Az erdőgazdálkodás hatása az erdők biológiai sokféleségére.

Teljes hivatkozás: Merkl Ottó (2016): A szaproxilofág bogarak (Coleoptera) szerepe a holtfa lebontásában. In: Korda Márton (szerk.) Az erdőgazdálkodás hatása az erdők biológiai sokféleségére.

Tanulmánygyűjtemény, DINPI, Budapest, pp. 129–154.

Rövid hivatkozás: Merkl (2016)

Első szerző: Merkl Ottó

Év: 2016

Összefoglalás

A holtfa fontos komponense az erdei ökoszisztémának, ezért megőrzése lényeges a szaproxilofág fauna fennmaradása szempontjából. A szaproxilofág közösségekben a bogarak domináns szerepet játszanak, különösen a fa lebomlásának első, kolonizációs szakaszában. Jelen dolgozat jellemzi a holtfa egyes típusainak bogárfaunáját, illetve javaslatokat nyújt a szaproxilofág bogárfauna védelmének lehetőségeire.

[biodiverzitás](#)

[biodiverzitás: ízeltlábúak](#)

[erdőökológia](#)

[holtfa](#)

[ökoszisztéma: pusztulás, lebontás, korhadás](#)

[természetvédelem](#)

Kiadó: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Lelőhely: ER Archívum - digitális

Típus: tudományos könyvrészlet, fejezet

Erdőrezervátumok: [Y - AZ ÖSSZES ERDŐREZERVÁTUM \(HU\)](#) Katalógusba vette:

Horváth Ferenc

Katalógusbavétel időpontja: szo, 10/23/2021 - 12:00