

Papp V. és Siller I. (2012): A Ganoderma cupreolaccatum (syn. G. pfeifferi) taxonómiai helyzete és magyarországi elterjedése. Mikol. Közlem., Clusiana 51(1): 76-78.

Teljes hivatkozás

Papp Viktor és Siller Irén (2012): A *Ganoderma cupreolaccatum* (syn. *G. pfeifferi*) taxonómiai helyzete és magyarországi elterjedése - The Hungarian distribution and taxonomic status of *Ganoderma cupreolaccatum* (syn. *G. pfeifferi*).

Poszterszekció 1. Gombarendszertan és ökológia - Poster session 1, Fungal systematics and ecology. Mikológiai Közlemények - Clusiana 51(1): 76-78.

Rövid hivatkozás

Papp és Siller (2012)

Első szerző

Papp Viktor

Év

2012

Összefoglalás

Magyarország területén öt *Ganoderma* faj (*G. adspersum*, *G. applanatum*, *G. cupreolaccatum*, *G. lucidum*, *G. resinaceum*) található, melyek közül a *G. cupreolaccatum*-ról (syn. *G. pfeifferi*) rendelkezünk a legkevesebb információval. Ennek a főként élő, idős bükkfák tövében termőtestet képző fajnak mindösszesen hat hazai előfordulási adatát ismerjük (Börzsöny: Nagy-Hideg-hegy; Bükk: Őserdő Erdőrezervátum; Mecsek: Erdősmecske, Kőszegi-forrás Erdőrezervátum; Vértes: Pusztavám; Zalai-dombság: Vétyem Erdőrezervátum). Jelen munkában négy újabb adatát közöljük a Malomvölgyi-árokban és Dobogókőről (Visegrádi-hegység), a Tátika Erdőrezervátumból (Bakony), valamint a Juhdöglő-völgy Erdőrezervátumból (Vértes). Ez az Európában és hazánkban is igen ritka *Ganoderma* faj nem szerepel a magyarországi vörös listán és a védett fajok között sem. Ökológiai igényeinek és hazai elterjedésének ismeretében azonban természetvédelmi szempontból nagyobb figyelmet érdemelne. Névhasználatával kapcsolatban ellentmondásos információkat találtunk, ezért fontosnak tartottuk, hogy a nomenklaturai szabályoknak megfelelően tisztázzuk a faj taxonómiai helyzetét. Az első Kernertől kapott termőtestet Kalchbrenner határozta meg 1882-ben, és azt, mint új fajt *Polyporus cupreolaccatus* névvel jelölte. Ezt a nevet Wettstein *Polyporus laccatus*-ra egyszerűsítette. A későbbi mikológiai munkákban

és a jelenlegi európai szakirodalomban viszont *Ganoderme pfeifferi* Bres. néven említik, melyet Patouillard közölt 1889-ben. Igmándy szerint a tévesen használt pfeifferi faji jelzőt azért részesítik előnyben, mert a *laccatus* nevet korábban már a *G. lucidum*-ra is alkalmazták. Igmándy álláspontjával egyetértve, véleményünk szerint a prioritás elvének szem előtt tartásával a *Ganoderma cupreolaccatum* (Kalchbr.) Z. Igmándy 1968 név használata a helyes.

[biodiverzitás: gomba, zuzmó](#)

[taxonómia, florisztika, faunisztika](#)

Megjegyzések

Címszavazva - VA

Folyóirat

Mikológiai Közlemények, Clusiana

Lelőhely

ER Archívum (2012/P-002/1, 2012/P-002/2)

Típus

konferenciaközlemény, absztrakt

Erdőrezervátumok

[Juhdöglő-völgy Erdőrezervátum](#)

[Kőszegi-forrás Erdőrezervátum](#)

[Őserdő Erdőrezervátum](#)

[Tátika Erdőrezervátum](#)

[Vétyem Erdőrezervátum - MÉG NINCS KIHIRDETVE](#)

Csatolt dokumentum

[Ganoderma cupreolaccatum taxonomiai helyzete es Moi elterjedese.pdf](#) 1.03

MB

Katalógusba vette

Gulyás Györgyi

Katalógusbavétel időpontja

sze, 08/15/2012 - 12:00