

Vojtkó A. (1992): A délnyugati Bükk dolomitnövényzetének előzetes vizsgálata. Fol. Hist.-nat. Mus. Matr., 17: 139-150.

Teljes hivatkozás

Vojtkó A. (1992): A délnyugati Bükk dolomitnövényzetének előzetes vizsgálata. Fol. Hist.-nat. Mus. Matr., 17: 139-150.

Rövid hivatkozás

Vojtkó (1992)

Első szerző

Vojtkó András

Év

1992

Összefoglalás

A délnyugati Bükk dolomitnövényzetének előzetes vizsgálata

A dolomit alapkőzet alárendelt szerepű a Bükk hegységben a triász mészkőtömbhöz képest, így jelentősége különleges sajátosságaiból adódik. A kőzet geomorfológiai tulajdonságai révén olyan mikroklímát alakít ki, amely nehezen engedi beerdősülni a dolomit lejtőket. A déli-délnyugati oldalakon ennek következtében páratlan fajgazdagságú, szubmediterrán jellegű nyílt és zártabb gyepek uralkodnak, váltakozva bokorerdő és tölgyes foltokkal.

Az Északi-középhegységben még nem történtek vizsgálatok a dolomitnövényzetre vonatkozólag, csupán utalásokat találhatunk (Suba et al. 1982, Bakalárné et al. 1982-83) a *Cypripedium calceolus* termőhelyjellemezése kapcsán. Ezt a hiányt felismerve kezdtünk vizsgálatokat a Déli-Bükkben: a Várhegy-Csákpilis és Miklós-hegy-Keréktörő-hegy dolomitnövényzetén. Részleges eredményként két, a Bükk hegységből eddig még nem említett növénytársulásra hívjuk fel a figyelmet: *Cotino-Quercetum pubescentis*, *Seslerietosum hungaricae* (bükkense), *Seslerio-Quercetum pubescenti-petraeae*.

[biodiverzitás: magasabb rendű növények
társulástan, cönológia](#)

Megjegyzések

Címszavazva - VA

Folyóirat

Fol. Hist.-nat. Mus. Matr.

Lelőhely

ER Archívum (1992/P-001)

Típus

tudományos folyóiratcikk

Erdőrezervátumok

[Vár-hegy Erdőrezervátum](#)

Katalógusba vette

Gulyás Györgyi

Katalógusbavétel időpontja

k, 07/01/2008 - 12:00