

Csicsek G., Ortmann-Ajkai A., Lukács M., Horváth F. (2013): *Eltűnő ősi erdőtípusunk - Az árterek szárazodásának egy kevésbé ismert következménye. Környezeti problémák a Kárpát-medencében*, II. Nemzetközi Klímakonferencia, Pécs

Teljes hivatkozás: Csicsek G., Ortmann-Ajkai A., Lukács M., Horváth F. (2013):
Eltűnő ősi erdőtípusunk - Az árterek szárazodásának egy kevésbé ismert következménye. Környezeti problémák a Kárpát-medencében, II. Nemzetközi Klímakonferencia, Pécs

Rövid hivatkozás: Csicsek és mtsai (2013)
Első szerző: Csicsek Gábor
Év: 2013

Összefoglalás

Jelentős eltérés található a Bükkhát erőrezervátum magterületén a cserjeszint és, alsó lombkoronaszint (jövő fái), illetve felső lombkorona szint (jelen fái) faji összetételében. Az állományalkotó kocsányos tölgy (*Quercus robur*) aránya a jövő fái között rendkívül alacsony, jelen állapotok szerint gyakorlatilag nem képes természetes módon újulni.

[erdőszerkezet: faállomány](#)

[erdőszerkezet: cserjeszint](#)

[élőhely: láp- és ligeterdők](#)

[Általános, egyéb ...](#)

Megjegyzések

„Környezeti problémák a Kárpát-medencében II.” – nemzetközi konferencia. Pécs 2012. november 30., Ortmann-né Ajkai Adrienne, Csicsek Gábor, Lukács Mária, Horváth Ferenc: *Eltűnő ősi erdőtípusunk – az árterek szárazodásának egy kevésbé ismert hatása* c. előadás alapján készült cikk.

Lelőhely: ER Archívum - digitális

Erdőrezervátumok: [Bükkhát Erdőrezervátum](#) Csatolt dokumentum: [Csicsek és mtsai \(2013\): *Eltűnő ősi erdőtípusunk - Az árterek szárazodásának egy kevésbé ismert következménye*](#)

Horváth Ferenc

Katalógusbavétel időpontja: p, 07/29/2022 - 12:00